

A

ウシガエル

外来種

とくていがいらいせいぶつ
特定外来生物せなか せん
背中に線はないこえ
なき声：ブオーツこまぐ
大きな鼓膜

提供：復建調査設計株式会社

いるところ

- ・ かせん ちしやう しつち
河川や池沼、湿地
- ・ 府中町全域

とくちょう

- ・ 活動：4月～11月
- ・ 繁殖：5月～9月上旬
- ・ 在来種を工サとし、ほかの力
工ルのすみかをうばう

B

ホテイアオイ

外来種

きゆうようちゆういがいらいせいぶつ
旧要注意外来生物いろ あわむらさき
花の色は淡紫色

はえているところ

- ・ こしやう すいろ
湖沼や河川、水路
- ・ 府中町全域

とくちょう

- ・ 開花：6月～11月
- ・ 葉：丸くてぶ厚い
- ・ 枯れて腐ると水が汚くなる
- ・ 在来種のすみかをうばう

C

カダヤシ

外来種

特定外来生物

3~5cm

メス

みじか
しりびれが短い

お 尾びれが丸い

オス

いるところ

- ・ すいでん ようすいろ
水田や用水路、池沼
- ・ 永田池

とくちょう

- ・ 活動：1年中
- ・ 繁殖：5月～10月（卵胎生）
- ・ ミナミメダカとよく似ており、
ミナミメダカのすみかをうばう

D

アメリカザリガニ

外来種

きゅうようちゅういがいらいせいぶつ
旧要注意外来生物



提供：復建調査設計株式会社

いるところ

- ・ 水田や池沼、河川
すいでん ちしやう かせん
- ・ 永田池や水分峡
ながたいけ みくまりきやう

とくちょう

- ・ 活動：春～秋の夕方
かつどう はる あき ゆうがた
- ・ 繁殖：春
はんしよく
- ・ 在来種を食べたり、すみかをうばう
ざいらいしゆ た

E

オオクチバス (ブラックバス) 外来種

とくていがいらいせいぶつ
特定外来生物



からだ
体の真ん中に帯状の
おびじやう

いるところ

- ・ ため池や河川
いけ
- ・ 永田池や水分峡

とくちょう

- ・ 活動：5月～10月に活発
かつぱつ
- ・ 繁殖：4月～7月
- ・ 在来種を食べたり、すみかをうばう

F

ブルーギル

外来種

特定外来生物



提供：復建調査設計株式会社

いるところ

- ・ 池沼や河川
- ・ 永田池

とくちょう

- ・ 活動：夏に活発
- ・ 繁殖：6月～7月
- ・ 在来種のすみかをうばう

G

ソウシチョウ

外来種

とくていがいらいせいぶつ
特定外来生物

くちばしが赤い

たいちょう やく
体長：約15c

のどのあたりが黄色い



いるところ

- ・ 竹林や笹やぶ
- ・ 府中町全域

とくちょう

- ・ 活動：1年中
- ・ 繁殖：4月～10月
- ・ ウグイス、コルリ、メジロなどの在来種のすみかをうばう

H

セイタカアワダチソウ

外来種

きゅうようちゅういがいらいせいぶつ
旧要注意外来生物はな じょう あつ つく
黄色い花が円すい状の集まりを作るなつ あき たか せいちょう
夏から秋にかけて高さ2～3mに成長

提供：復建調査設計株式会社

はえているところ

- ・ 河川敷や休耕地、路肩
- ・ 永田池

とくちょう

- ・ 開花：8月～11月
- ・ 毒素で他の植物を枯れさせ、家畜が食べると中毒をおこす

I

ヌートリア

外来種

特定外来生物

うし あし みず
後ろ足に水かきまえば いろ
前歯がオレンジ色

提供：復建調査設計株式会社

いるところ

- ・ 河川や水路、ため池の水際
- ・ 榎川や八幡川、府中大川

とくちょう

- ・ 活動：1年中(夜に活発)
- ・ 繁殖：春～秋
- ・ 在来種を食べ、堤防や水田、池に巣穴をつくって壊す

J

アルゼンチンアリ

外来種

とくていがいらいせいぶつ
特定外来生物

提供：復建調査設計株式会社

いるところ

- ・公園や住宅地
- ・府中町全域

とくちょう

- ・活動：1年中
- ・繁殖：初夏～秋
- ・農業、はちみつ被害、家への侵入
- ・在来種のすみかをうばう

K

オオキンケイギク

外来種

特定外来生物



はえているところ

- ・土手や河原、空き地
- ・府中町全域

とくちょう

- ・開花：5月～7月
- ・結実：夏～秋
- ・在来種のすみかをうばう

L

ミシシッピアカミミガメ

外来種

きゅうようちゅういがいらいせいぶつ
旧要注意外来生物

提供：復建調査設計株式会社

いるところ

- ・川岸やため池、水路
- ・府中町全域

とくちょう

- ・活動：1年中(昼に活発)
- ・繁殖：4月～7月
- ・在来種のすみかをうばう